





VII, VIII ),

**Рисунок 1.**  
Сливная, пятнисто-папулезная сыпь, стазы и геморрагии спустя 2 часа от начала развития молниеносной менингококкемии у ребенка 1 года



**Рисунок 2.**  
Типичная геморрагическая сыпь в виде «чернильных пятен» или «звездного неба» спустя 24 часа от начала развития молниеносной менингококкемии у ребенка 2 лет 8 мес.

КОЛЛАПТОИДНЫХ

39-40°

»,

(

),

200

1

2-3-

(III, VI,

**Таблица. Шкала комы Глазго для детей и взрослых**

			Баллы
Глаза	Открытие	Спитанное	4
		По словесной команде	3
		На боль	2
		Не открывает	1
Лучший двигательный ответ	По речевой команде В ответ на болевой стимул	Выполняет команды	6
		Локализует боль	5
		Отдергивание (уход от боли)	4
		Патологическое сгибание	3
		Разгибание	2
		Нет ответа	1
Лучший речевой ответ	Взрослые	Ориентирован, отвечает	5
		Дезориентирован, отвечает	4
		Бессмысленные слова	3
		Бессмысленные звуки	2
		Нет ответа	1
	Дети	Ориентирован	5
		Произносит слова	4
		Отдельные звуки	3
		Слов	2
		Нет ответа	1
ВСЕГО: глаза — 1-4, движение — 1-6, речь — 1-5			3-15

1)

2)

(uncus).



ния. относятся: ( , ) ;  
 — ( , ) ;  
 — ( ) ;  
 — ( ) ;  
 — ;  
 — ( 40° );  
 — ( 4-5 , 8-10 / 15-20 ;  
 АД<sub>сисст</sub> < 75 мм рт.ст. у детей до 4 лет, АД<sub>сисст</sub> < 85 мм ( 4 ) ;  
 — 3 8 ) .  
 ДОЛЖНО  
 яв- 0,3-0,5 / ( )  
 / 80-100  
 , / 1%-ного 3-5 /  
 , , ( 50 / ) ,  
 ( «Venflon» — — ,  
 « » ) — — ,  
 0,9%- / / 3-5 / 60 !  
 ( , ) ( -  
 ) .  
 20 / / . 10- ( ,  
 (100 ) — 5-10 / ( 1 ) ( -  
 III ( -  
 50 / ) . , /  
 25 / - -