

(SD)

... , ... - , ... ,

— , PTSD, DSM III-R (). PTSD

(). , - PTSD

« » (PTSD). (flashbacks),

DSM III-R de je vu),

PTSD

40 ; ;

39 — 16 20 29 — 21 30 , ;

40 49 — 3 , ()

PTSD (—). ; ;

() ; ;

(31) PTSD

височно-теменной

3-5 ()

20 2-11 ;

PTSD. « »

56% (. 1). таточно .
 «
 » ()
 « » « » (27%)
 ; , конвексительного
 седативных ()

Таблица 1. Сравнительная характеристика цефалгий у больных с последствиями боевых ЧМТ и PTSD и ЧМТ мирного времени

Характер головных болей	Последствия боевых ЧМТ (%)	Последствия ЧМТ мирного времени (%)
Ликворно-гипертензионные	47,6 ± 3,0	27,6 ± 2,0
По типу «невротического шлема» (мышечного напряжения)	—	20,0 ± 3,0
Сосудистого характера	23,5 ± 2,0	16,1 ± 2,0
Мигренозные цефалгии	—	36,3 ± 1,5
Цервикокраниалгии:		
мышечно-тонический вариант	24,5 ± 1,0	28,3 ± 2,0
вегетативно-сосудистый вариант	12,4 ± 2,3	11,8 ± 3,0

),
 ()
 —),
 лобно-височно-глазничную
 ;
),
 PTSD
 3
 1/4
 гипертензионных мышечно-тонических
 эпилептиформные,
 (Grand mal)
 PTSD
 но-гипертензионные цефалгии.
 —
 ликворно-гипертензионная гидроцефальные
 PTSD
 Гуревича — Манна,
 регуляторных