



**Выводы**

100);  
3) ( )  
1  
( .4).  
фармакоэкономическим ( .4),

**Таблица 1. Величина ЧСС в зависимости от интенсивности болевого синдрома**

	2 часа	6 часов	12 часов	1-е сутки	2-е сутки	3-и сутки	4-е сутки
1-я группа (омнопон)	105 ± 6,1	112 ± 6,1	106 ± 2,4	105 ± 3,9	105 ± 3,6	92 ± 1,7	90 ± 2,4
2-я группа (кетонал)	105 ± 4,9	110 ± 7,4	106 ± 4,1	100 ± 1,9	97 ± 3,7	81 ± 3,9	77 ± 3,9
3-я группа (Мовалис)	106 ± 2,3	110 ± 6,9	98 ± 3,6	92 ± 2,6	82 ± 4,5	76 ± 4,3	72 ± 2,8

**Таблица 2. Интенсивность боли по шкале ВАШ в покое (10 баллов)**

	2 часа	6 часов	12 часов	1-е сутки	2-е сутки	3-и сутки
1-я группа (омнопон 20 мг (1 амп.) 3-4 раза в сутки)	0	8	5	5	4	2
2-я группа (кетонал 100 мг (1 амп.) 4 раза в сутки)	0	10	6	4	3	1
3-я группа (Мовалис 15 мг (1 амп.) 1 раз в сутки)	0	9	3	3	2	1

**Таблица 3. Интенсивность боли по шкале ВАШ при кашле (10 баллов)**

	2 часа	6 часов	12 часов	1-е сутки	2-е сутки	3-и сутки
1-я группа (омнопон 20 мг (1 амп.) 3-4 раза в сутки)	0	8	6	6	4	2
2-я группа (кетонал 100 мг (1 амп.) 4 раза в сутки)	0	10	7	6	4	2
3-я группа (Мовалис 15 мг (1 амп.) 1 раз в сутки)	0	9	5	5	3	2

Исследование ( ) ( .2),  
( .4).  
ингибировании -2.  
действие.

**Таблица 4**

Препарат	Количество ампул за 4 суток
Омнопон	10-14
Кетонал	20-24
Мовалис	4