

616.98:578]-036.11:616.24-008.41-085

:

()

[2].

(« ») (облг
) « ВЯЗ-
(ларинготрахеит)»,
Х — «
».

« ».

[1-3].

6

7

3

()

);

[2, 4].

1- 2-
3-

[1, 5].

[6].

6-

0,25-1,0 / . (

2-4

1

II

2

(р/сут.).

() .

0,25

12

0,25 1 / .

() .

I-II

1

38

В.И.

55

(29

26

I-II

6

6

),

1-2-

4-8 /

40

() .

0,25-0,5 2 / . (

1-

2 сут.),

0,25

1 / .

(15

)

2-5

1, 2, 3, 6, 12 24

3-7

3-6

(« »)

10-15 %,

0 3: 0 —

, 1 —

, 2 —

, 3 —

1

50 %

5




Рисунок 2. Продолжительность клинических проявлений синдрома крупа у детей с ОРВИ. Различия между группами достоверны ($p < 0,05$)

— 61 %, — 27 %, — 13 %

),

(. 1).

54 %

10 %

(. 2).

1-2

30 %

70 %




Рисунок 1. Динамика суммы баллов клинических симптомов крупа. Различия внутри группы по сравнению с предыдущим этапом наблюдения и различия между группами достоверны ($p < 0,05$)

[6].

I-II

[7]. Не-

1. О.В. . . . дис ... — М., 2003.
2. . . . — М., 2001.
3. Kovacevic S., Nikolic S. // Abstracts of 10th Congress ERS. — Florence, 2000. — P. 486.
4. Faroogi I.S., Hopkin J. // Thorax. 1998. — Vol. 53. — P. 927.
5. В.В. др. // Научно-практическая « . . . ». — М., 1999. — С. 67.
6. Ю.Б., Омеляновский В.В. . . . — М., 1996.
7. Фармакоэкономическая . . . — Екатеринбург, 2003.