

.....

---

.....

---

[5].

*anesthesia dolorosa*

9-

9-

(

);

30

ХОЛИНОЛИТИКОВ,

[4]

(  
, 3- )

СМОЛ

[1, 2],

( *mixtio*— )  
( ).

1. 2

7

39

« »

( )

2.

( );

6-8-

5-8-

1. *Большая*50 . 3

— 5- дню.  
3. *Большая* — тяжесть  
« »,  
[6, 7]  
6. ( );  
— 2-3 ;  
( ) [3].  
лечения:  
ЛФК),  
— 7- дню.  
( ),  
и  
1. 60 лет.  
( ).  
5-  
дискинетическом  
, при СРК — дюспаталин,

2. 39 лет  
,  
3. 62  
2-3  
( )  
ТОЛЬКО  
1. Эльштейн . . .  
практике. — М.: , 1998. — С. 51-62.  
2. СС  
, 2002. — С. 91-93.  
3. // . . . межрегиональной науч.-  
« » —  
— 2002. — С. 138.  
4. . . .  
, 1999. — . 385, 666-667.  
5. Ю.М., В.В.  
. — ., 2000. — С. 8.  
6. Шептулин . . .  
// Консилиум-медикум.  
: . — 2002. — С. 3.  
7.  
. — 2000. — №3. — С. 4. □ //

ABDOMINAL MIXED PAIN

O.V. Zaytsev, Kovrov, Russia

Summary. The different classifications of abdominal mixed pain confirmed by clinical examples are represented.

Key words: abdominal pains, classification, mixts.